


SEMINARIO INTERNACIONAL DE REHABILITACION INTEGRAL NUTRICIONAL

25 AL 30 JUNIO 1990
COCHABAMBA - BOLIVIA



BO
612.063
B689s

LIBRO DE RESUMENES

FACTORES PSICOGENOS QUE INTERVIENEN EN LA DESNUTRICION INFANTIL

J.C. Lafuente, M.L. Flores, R. Sevilla, E. Suarez, J.G. Pelletier, E. Sejas, L. Zalles, Ph. Chevalier, G. Parent, P. Pelliza, CRIN Hospital Materno Infantil German Urquidi, Cochabamba, Bolivia.

Numerosos autores señalan que la etiología de la desnutrición infantil, es originada por múltiples causas; asimismo relievan la importancia de los factores psicógenos en la misma. El objetivo está orientado a detectar los factores psicógenos que intervienen en la desnutrición de los niños internados en el CRIN.

Se utilizó el método de observación directa y el estadístico, y un cuestionario de selección forzado dirigido a la madre.

La población estudiada está constituida por 40 niños con desnutrición grave, internados en el CRIN (edad promedio 16 meses) comparado con un grupo control de 120 niños (eutróficos) de 3 barrios suburbanos de donde provienen los niños del CRIN.

Según los resultados el grupo de niños desnutridos tiene 5 veces más familias desestructuradas y 4 veces más de madres que asumen la responsabilidad económica ($X^2, P < 0.001$). Estas madres tuvieron mayor número de embarazos e hijos fallecidos ($X^2, P < 0.01$), asimismo el uso de alcohol en la familias de los niños internados es mas frecuente ($x^2, P < 0.01$) en el CRIN.

En el grupo del "CRIN" se observó dos veces mayor la prelactación inadecuada y no progresiva ($X^2, P < 0.001$). Se nota también una frecuencia mayor de destete brusco y forzado ($X^2, P < 0.001$). Se nota también una frecuencia mayor de destete brusco y forzado ($X^2, P < 0.001$) además el vínculo afectivo del niño con el padre es menos frecuente así como la separación o ruptura de un vínculo afectivo y hospitalizaciones previas a la enfermedad ($X^2, P < 0.01$).

Estas familias frecuentaron 2 veces más al Yatiri o Jampiri ($X^2, P < 0.01$) en ambos grupos se observó un sincretismo religioso cultural. Los D.N.T. tuvieron mayor frecuencia de enfermedades culturales y de prácticas culturales en la familia ($X^2, P < 0.001$).

Se ha comprobado que los factores psicógenos son muy importantes en la etiología de la desnutrición de los niños del CRIN y que éstos factores de riesgo provienen del medio externo.

A través de este estudio se logró programar adecuadamente el abordaje psicoterapéutico dentro del CRIN y permitirá un enfoque específico a nivel preventivo.