


SEMINARIO INTERNACIONAL DE REHABILITACION INTEGRAL NUTRICIONAL

25 AL 30 JUNIO 1990
COCHABAMBA - BOLIVIA



BO
612.063
B689s

LIBRO DE RESUMENES

MANEJO PSICOLOGICO IMPLMENTADO EN NIÑOS HOSPITALIZADOS POR DESNUTRICION GRAVE. J.C. Lafuente, M.L. Flores, R. Sevilla, Ed. Sejas, Ph. Chevalier, E. Suarez, L. Zalles, G. Parent, P. Brun, P. Pessoa, CRIN, Cochabamba, Bolivia.

El objetivo de este trabajo es la exposición de los estados psicológicos manifestados por los niños desnutridos del CRIN y la presentación del programa de apoyo psicológico en el CRIN.

Los métodos utilizados fueron, el método de observación directa y el clínico, con el apoyo de técnicas e instrumentos psicológicos.

El programa psicológico, estuvo orientado en 3 niveles:

- 1.- La Rehabilitación psicológica de los factores endógenos afectados por la desnutrición a nivel psicoafectivo y psicomotor.
- 2.- El abordaje psicológico dentro los factores exógenos pretende realizar cambios favorables a nivel socio-familiar y materno.
- 3.- Posterior a un tratamiento por separado de ambos factores que intervienen en el proceso de interacción, para transformar, mejorar y estabilizar la relación gratificante con el niño.

Al momento de la internación presentan un retraso psicomotor de un 73.5% así como alteraciones a nivel de la vida instintiva emocional, afectiva, psíquica, estados de conciencia, sueño, etc.

La evolución de los estados y el tipo de tratamiento psicológico durante 9 semanas dentro del CRIN, está condicionada a las características y estados específicos de cada niño.

1ra. Semana: Apatía profunda o rechazo; con terapias psicoafectivas.

2da. y 3ra. Semana: Respectividad pasiva o dependencia, se interviene con terapia del vinculo materno-infantil.

4ta.,5ta.,6ta. Semana: Respectividad activa; con estimulación temprana.

7ma.,8va. Semana: Conducta exploratoria o conflictos infantiles; con terapias de apoyo infantil y estimulación temprana.

9na. Semana: Conducta hiperactiva: con programa de frustración.

Durante 10 meses de seguimiento extrahospitalario existen alteraciones en la adaptación, sueño, comportamiento, agresividad, etc. así como problemas socio-familiares que paulatinamente se van estabilizando a través de la consejería, orientación psicológica.

Aún siendo los resultados parciales, la intervención psicológica fue muy importante en el tratamiento integral de esta población.