61. FACTORES DE RIESGO EN LA PRODUCCION DE ACCIDENTES VASCULARES CEREBRALES

Barragan, M.; Aparicio, M.; Bellido, D.; Galarza, M.; Aguilar, M.; Rodriguez, A.; Quintela, A.

Instituto Boliviano de Biología de la Altura

Para la realización del Estudio de Factores de Riesgo en la producción de Accidentes Vasculares Cerebrales (AVC) en la Altura, se consideró 186 pacientes internados en el Servicio de Neurología y Neurofisiología dependiente del I.B.B.A., durante la gestión 1990 - 1991. Se diagnosticaron 27 casos de AVC, seleccionándose de los 156 pacientes restantes a los "controles" de acuerdo a sexo y edad +/- cinco años.

Los 27 casos de AVC fueron clasificados de acuerdo al Algoritmo Clínico utilizado internacionalmente en base a criterios clínicos de Laboratorio y Gabinete. Se observó 16 casos en el Sexo Femenino (59 ,26%) y 11 casos en el Sexo Masculino (40.74%). De acuerdo al Tipo de AVC, se diagnosticaron: 6 casos Trombóticos, 10 casos Embólicos, 8 casos Hemorrágicos y 3 casos indeterminados.

En comparación a estudios realizados a nivel de la costa, se evidenció la existencia de un menor número de casos de Tipo Trombótico, sin embargo, en la altura predominan los casos de Tipo Embólico, secundarios principalmente: a la Cardiopatía Reumática y Endometritis Postparto.

En cuanto a los valores tensionales: la Hipertensión Sistólica es un factor de riesgo en la producción de AVC de Tipo Trombótico (Chicuadrado=19.81). La Hipertensión Diastólica es un factor de riesgo para los AVC de Tipo Hemorrágico (Chi-cuadrado = 24.47).

Se observó que la Edad y el Sexo no determinan el Tipo de AVC (Chi-cuadrado = 21.5).